


Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916



Les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes et Potentiellement Envahissantes

Formation – Rivière et vallée du Fangu (site Natura 2000 FR9400577) – 02 juin 2026



SOMMAIRE

PARTIE 01 – LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE CORSE (CBNC)

PARTIE 02 – LA FLORE DE CORSE

PARTIE 03 – QU'EST-CE QU'UNE ESPÈCE VÉGÉTALE EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?

PARTIE 04 – CADRE RÉGLEMENTAIRE

PARTIE 05 – FOCUS SUR LES EVEE ET EVEPOTE PRÉSENTES SUR LE SITE NATURA 2000

PARTIE 06 – ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PARTIE 07 – COMMENT AGIR À SON NIVEAU ?

PARTIE 08 – INVMED

PARTIE 09 – SORTIE TERRAIN




I. LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE CORSE (CBNC)

- Service de l'OEC
- 18 agents
- Agréé par le Ministère de la transition écologique
- Attributions définies par le Code de l'Environnement
- Territoire d'agrément : la Corse et ses îlots satellites



Nos missions ?


- Connaissance et inventaire de la flore (plantes vasculaires, mousses et algues)
- Connaissance et inventaire de la fonge (champignons et lichens)
- Connaissance et inventaire de la végétation et des habitats
- Conservation de la flore et des habitats rares et menacés
- Expertise scientifique et technique auprès des pouvoirs publics
- Communication et sensibilisation du public



II. LA FLORE DE CORSE

Hotspot de biodiversité

25 hotspots de biodiversité mondiaux



12 hotspots de biodiversité du bassin méditerranéen



D'après Médail, et Quézel, 1997. complété par Véla et Benhouho, 2007. puis par Véla, 2018



Certaines îles et presqu'îles considérées comme des hotspots régionaux

Plusieurs facteurs expliquent la singularité de cette richesse floristique :

- L'isolat
- Géologie diversifiée
- Relief important
- Climat particulier
- Etages de végétation marqués

Hotspot de biodiversité ?

Zone dont la biodiversité est très élevée et les pressions sur celle-ci par l'Homme sont fortes

Quelques chiffres...

- Une biodiversité spécifique, rare et menacée en Corse



Vue depuis Castellu à i Ladri



Anchusa crispa subsp. *crispa* Viv. 1825

2 727 taxons

560 espèces **exogènes**

- Dont 64 exotiques envahissantes
- Et 293 exotiques potentiellement envahissantes

302 espèces **endémiques** s.l.

- 132 endémiques strictes
- 170 sub endémiques


165 taxons **menacés**

(Liste Rouge Régionale de la Flore Vasculaire Corse, 2015 : CR, EN, VU)

III. QU'EST-CE QU'UNE ESPECE VEGETALE EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?

Définitions et concepts

1. Statut d'indigénat : **Exogène** ou **Indigène** ?
2. Date d'introduction : **Néophyte** ou **Archéophyte** ?
3. Naturalisation : **Etablie** ou **Occasionnelle** ?
4. Potentialité de se propager sur de larges zones : capacité de prolifération importante ?




🍷 Espèce végétale exotique :

→ Introduite **volontairement** ou **accidentellement** en **dehors de son aire de répartition naturelle**

🍷 Après **la fin du XVème siècle** (découverte de l'Amérique = augmentation des échanges commerciaux mondiaux)

Définitions et concepts

1. Statut d'indigénat : **Exogène** ou **Indigène** ?
2. Date d'introduction : **Néophyte** ou **Archéophyte** ?
3. Naturalisation : **Etablie** ou **Occasionnelle** ?
4. Potentialité de se propager sur de larges zones : capacité de prolifération importante ?



3 l'espèce est **établie**, **survie** et se **reproduit** de manière autonome

4 l'espèce se disperse, **envahit** au-delà du point d'introduction initial et se **propage**

Une espèce végétale invasive (syn. exotique envahissant) correspond à une espèce introduite en dehors de son aire de distribution naturelle (exogène), qui se reproduit de manière autonome (naturalisée) et qui produit beaucoup de diaspores pouvant elles-mêmes se reproduire, ce qui confère à cette espèce une forte capacité d'expansion spatiale (Fried *et al.*, 2024).


Définitions retenues par le CBN de Corse sur son territoire d'agrément

✓ **Espèce végétale exotique envahissante (EVEE) :**

- Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation sur le territoire considéré
- Dynamique de colonisation rapide sur ce territoire en raison de sa reproduction efficace et de sa capacité à se propager rapidement.

✓ **Espèce végétale exotique potentiellement envahissante (EVEpotE) :**

- Taxon exotique en voie de naturalisation, accidentel ou planté qui est peu présent sur le territoire considéré ou absent
- Caractère envahissant dans un territoire limitrophe à climat proche ou a un risque intermédiaire à élevé de devenir envahissant sur le territoire.



Espèces végétales exotiques envahissantes en Corse



64 EVEC en Corse

Quelques espèces présentes sur le site Natura 2000



Oxalis pied de chèvre à Aiaciu
Oxalis pes-caprae L., 1753



Ailante glanduleux sur la route d'Aleria
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916



Griffe de sorcière à Aiaciu
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926



Figuier de Barbarie à Prupia
Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768



Faux cotonnier à Belgudè
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton, 1811



Mimosa d'hiver à Calinzana
Acacia dealbata Link, 1822



Espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes en Corse



293 EVEpotE en Corse



Pin Australien

Casuarina cunninghamiana Miq., 1848




Sénéçon sud-africain à Arru

Senecio inaequidens DC., 1838



Flamboyant d'Hyères sur le fleuve du Reginu

Sesbania punicea (Cav.) Benth., 1859



Aloé arborescente à Aïacciu

Aloe arborescens Mill., 1768



Pourquoi sont-elles introduites ?

- Ornement
- Aménagement (fixer les talus, stabiliser les dunes...)
- Agriculture et sylviculture



Ornement



Jacinthe d'eau – *Pontederia crassipes*

Fixation des talus



Griffe de sorcière – *Carpobrotus edulis*

Fixation de la voie ferrée



Ailante glanduleux – *Ailanthus altissima*

Ornement, haie défensive, alimentation



Figuier de Barbarie – *Opuntia ficus-indica*


Ornement



Herbe de la pampa – *Cortaderia selloana*



Sylviculture



Robinier pseudo-acacia – *Robinia pseudoacacia*

Divers impacts

✓ Ecologiques

Baisse de la biodiversité :

🍷 **Modification des écosystèmes** (structure, composition, fonctionnement)

Ex : Mimosa d'hiver (*Acacia dealbata* Link, 1822) ou la Jussie rampante (*Ludwigia peploides* (Kunth) P.H.Raven, 1964)

🍷 **Pollution génétique**

🍷 **Compétition avec les espèces indigènes** (menace pour les biotopes exceptionnels et les espèces rares)

Ex: Griffes de sorcière (*Carpobrotus* sp.)

🍷 **Perte de biodiversité** (banalisation de la flore, uniformisation des habitats naturels, perturbation des cortèges faunistiques) ...



Plusieurs EEE et EEEpotE à Ajaccio



Jussie rampante à Figari



Divers impacts

Griffe de sorcière à Aiacciu




Plusieurs EVEC et EVEpotE
à la Revellata



Herbe aux écouvillons à Calvi



Figuier de Barbarie à l'Ostriconi




© I. OUIQUERZ

Griffes de sorcière à Punta di Capineru



© L. FAUSTI

Plusieurs EVEC et EVEpotE à Pruprià




Divers impacts

- ✓ **Socio-économiques**
- 🍷 **Obstruction des voies d'eau**
- 🍷 **Envahissement des routes**
- 🍷 **Baisse de rendement de récolte** : remplacement des espèces indigènes

Ex : La stipe à feuilles dentées (*Nassella trichotoma* (Nees) Hack., 1894) ou la stipe de Nees (*Nassella neesiana* (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990) ;

- 🍷 **Baisse de pâturage** car espèces non consommées par le pâturage et certaines sont toxiques :

Ex : Le séneçon du Cap (*Senecio inaequidens* DC., 1838)



Divers impacts

✓ Sanitaires


🍂 Allergène

Ex : L'ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia* L., 1753) :

- Allergène chez 6 à 12% de la population française
- 2 à 3 milliards de graines de pollen sur un pied
- 5 graines de pollen par m³ d'air pour que les symptômes se manifestent

Ex : Herbe de la pampa (*Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900) :

- Allergène
- Feuilles coupantes



IV. CADRE REGLEMENTAIRE

Règlementation Européenne

Règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des EEE

- ✓ Listes d'EEE préoccupantes pour l'UE :
- 🍂 Listes mises en place en 2016
- 🍂 Listes mises à jour par des Règlements d'Exécution (2017, 2019, 2022 et 2025)
- 🍂 114 espèces végétales et animales exotiques envahissantes (2025)
- 🍂 Liste de consensus basée sur une évaluation de risques



*Hors transport des
spécimens collectés vers
les sites de destruction*

Nombre d'EVEE réglementées dans l'Union Européenne	Nombre d'EVEE présentes en France	Nombre d'EVEE présentes en Corse
49	34	15 (dont 5 données anciennes et/ou imprécises)

Pourquoi une réglementation européenne ?

- 🍷 **Meilleure coordination des actions**
- 🍷 Mise en place d'une **stratégie harmonisée**



✓ Les Etats membres doivent :

- 🍷 **Proposer une liste** d'espèces exotiques envahissantes
- 🍷 Mettre en place une **stratégie nationale**
- 🍷 **Identifier les voies d'introduction** et les gérer
- 🍷 Mettre en place des **mesures relatives** à :
 - **La prévention** (mesure nécessaire pour empêcher l'introduction dans l'UE et leur introduction et libération dans l'environnement),
 - **La détection précoce et l'éradication rapide** (mesures pour permettre de repérer rapidement les EEE dans l'environnement, mesures à prendre en cas de détection),
 - **La gestion des EEE largement répandues** (mesures de lutte contre les EEE déjà présentes, celles nouvellement arrivées qui sont parvenues à se propager largement).

Règlementation nationale

Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des EEE sur le territoire métropolitain

- 🍷 Transposition de la loi européenne
- 🍷 Complément des mesures européennes
- 🍷 Sont réglementées :
 - les espèces réglementées par le Règlement (UE) n°1143/2014
 - d'autres espèces spécifiquement réglementées sur le territoire français.
- 🍷 Deux niveaux d'interdiction :
 - Espèces de niveau 1 : la libération/plantation de spécimens dans le milieu naturel est interdite.
Ne sont concernées à ce jour que quelques espèces animales.
 - Espèces de niveau 2 : introduction, vente, détention, utilisation, l'échange ou transport de spécimens vivants sont interdits. **Les espèces végétales se trouvent dans cette catégorie.**

Nombre d'EVEE réglementées en France	Nombre d'EVEE présentes en France	Nombre d'EVEE présentes en Corse
2	2	1



Réglementées depuis le 2 mars 2023 :

- 🍷 Herbe de la pampa, *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
- 🍷 Crassule de Helms, *Crassula helmsii* (Kirk) Cockayne, 1907

Quelques espèces réglementées

Mentionnées sur le site Natura 2000



Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916



Acacia mearnsii De Wild., 1925

Règlementation en Corse

Contexte

- 2019 : l'État français autorise le Président du Conseil Exécutif de Corse à interdire l'introduction d'espèces végétales ou animales envahissantes sur l'île (**article 8 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019**). Elle confère :
 - la responsabilité administrative de délivrer les autorisations relatives aux actions menées sur les espèces exotiques envahissantes,
 - L'établissement des listes espèces concernées,
- 2021 : transfert de compétence approuvée par l'Assemblée de Corse (**Délibération n° 21/222 AC**) ;
- 2025 : parution du **Décret n° 2025-218** mise en cohérence et modification de la partie réglementaire du Code de l'environnement (**articles R.411-38, R. 411-40 et R. 411-42 de la section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV**) et précision des modalités selon lesquelles le président du Conseil exécutif de Corse établit ces listes réglementaires et délivre les autorisations.


Lexique

Reproduction

- Drageon : Pousse aérienne issue de la racine ou du rhizome d'un végétal
- Stolon : Tige rampante aérienne, qui s'enracine aux nœuds et forme de nouveaux individus
- Rhizome : Tige souterraine, horizontale qui émet des racines adventives (face inférieure) et une ou plusieurs pousses aériennes (face supérieure)
- Rejet de souche : Jeune pousse issue d'un bourgeon situé sur la souche, le tronc ou les branches souvent produit à la suite d'une coupe ou d'un stress
- Bouturage : Individu produit à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé (morceau de rameau, feuille, racine, tige, écaille de bulbe).


DRAGEON

Tige issu d'un bourgeon situé sur la racine ou au collet de la plante mère. Il pousse verticalement et forme un nouvel individu.



RHIZOME

Tige souterraine, généralement horizontale, qui se développe sous terre. Elle porte des bourgeons qui donnent naissance à de nouvelles tiges aériennes.



STOLON

Tige aérienne, longue et mince, qui se développe à la surface du sol. À ses nœuds, elle émet des racines et donne naissance à de nouveaux plants.




Schéma produit par IA

V. FOCUS SUR LES EVEE ET EVEPOTE PRÉSENTES SUR LE SITE NATURA 2000

Mimosa d'hiver - *Acacia dealbata* Link, 1822

Description



J F M A M J J A S O N D

- Arbre à feuillage persistant
- 5 à 15 mètres
- Feuilles** : bipennées, d'un gris-vert argenté. 8-20 paires de folioles de 2-3 cm de long. Jeunes rameaux blanches-tomenteuses
- Fleurs** : glomérules, de couleur jaune citron, parfumés
- Fruits** : gousses marrons aplaties de 4 à 10 cm de long et de 10 à 12 mm de large



Mimosa d'hiver - *Acacia dealbata* Link, 1822

Milieux

- Berges et ripisylves
- Dunes côtières et plages de sable
- Forêts et maquis
- Milieux anthropiques (bords de routes, bords de chemin de fer...)



© Y.PETIT

Reproduction

Sexuée

- Pollinisation par les insectes
- Production des graines dès 4 ou 5 ans
- Dissémination par les oiseaux, les fourmis, l'eau, le vent fort ou les activités humaines
- Durée de vie de la graine : 50 ans




© A.ABOUCAYA

Asexuée (végétative)

- Drageons + rejets de souche
- Extension des peuplements
- Accentuée si état de stress (lésion des racines, taille, coupe...)



Données issues de la base de données SIMETHIS



Mimosa argenté, Mimosa de Mearns, Acacia noir - *Acacia mearnsii* De Wild., 1925





J F M A M J J A S O N D

Règlementée en Europe depuis 2025
EVEE Modérée

Description

- Arbre à feuillage persistant à écorce noir brunâtre, fissurée, mais gris-brun et lisse sur les jeunes troncs
- Taille** : 3 à 30 m
- Feuilles** : bipennées, verte olive à vert foncé. 8-20 paires de pennes, folioles de 2 mm. Jeunes rameaux couverts d'un duvet jaunâtre
- Fleurs** : glomérules, de couleur jaune crème pâle, parfumés
- Fruits** : gousses brun foncé ou noirâtre à maturité, pubescentes (poilues)



Ne pas se fier au nom vernaculaire car les feuilles sont plutôt vert foncé, tandis que le mimosa d'hiver a des feuilles gris argenté

Mimosa argenté, Mimosa de Mearns, Acacia noir - *Acacia mearnsii* De Wild., 1925

Milieux

- Forêts
- Bords de cours d'eau
- Dunes littorales
- Zone d'agriculture intensive
- Milieux anthropiques (bords de routes...)



Données issues de la base de données SIMETHIS


Reproduction

- Sexuée
 - Pollinisation par les insectes
 - Dissémination par les animaux, l'eau, le vent ou les activités anthropiques
 - Durée de vie de la graine : + de 50 ans voire jusqu'à 90 ans
- Asexuée (végétative)
 - Drageons + rejets de souche
 - Extension des peuplements
 - Accentuée si état de stress (lésion des racines, taille, coupe...)



Dernière mention : 2019
Non-revu en 2025



Carte : CBNC, 2026



Comment différencier les deux espèces ?

Acacia mearnsii (EVEE)

- Glomérules jaune crème pâle
- Jeunes rameaux jaunâtres
- Feuillage vert olive à vert foncé
- Gousses pubescentes, droites




Acacia mearnsii

Acacia dealbata


Acacia dealbata (EVEE)

- Glomérules jaune citron
- Jeunes rameaux blanches tomenteuses
- Feuillage gris-argenté
- Gousses sub-glabres, étranglées entre les graines



Risques de confusion


Acacia mearnsii



Acacia dealbata



Acacia baileyana (EVEpotE)



Photos issues de la monographie des Leguminosae de France (Coulot et Rabaute, 2025)

Mimosa d'hiver - *Acacia dealbata* Link, 1822

Mimosa argenté, Mimosa de Mearns, Acacia noir - *Acacia mearnsii* De Wild., 1925

Méthodes d'éradication

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Jeunes plans ou rejets :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : drageons, rejets de souche...) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Arbustes ($\emptyset < 10$ cm) :

- Abattage + dessouchage mécanique complet (avec extraction maximale du système racinaire accessible) afin de limiter les reprises végétatives à partir des fragments restants → suivi annuel sur 5 ans
- Abattage + fauche des rejets au plus près du sol (5 à 6 fois par an) → suivi annuel sur 5 ans


Arbres ($\emptyset > 10$ cm) :

- Abattage + fauche des rejets au plus près du sol (5 à 6 fois par an) → suivi annuel sur 5 ans
 - Cerclage/annelage/écorçage : écorcer l'arbre jusqu'au xylème sur 40 cm de hauteur
→ Ecorçage + élimination des rejets/drageons/épaississements cicatrisés sur l'arbre 1 fois par an pendant 3 ans
→ Contrôle pendant 2 ans après les 3 années d'écorçage
- A ne pas faire en cas de danger si chute de l'arbre !

Gestion des déchets

- Parties souterraines : exportation/incinération (pour éviter toute reprise)
- Parties aériennes : incinération, broyage, compostage ou laisser sur place (si absence de fruits/graines)

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Agave d'Amérique - *Agave americana* L., 1753

Description



J F M A M J J A S O N D

EVEE Modérée

- Plante succulente vivace
- Taille** : de 4 à 10 m avec la hampe florale
- Feuilles** : toutes en rosette basale, charnues et persistantes l'hiver, oblongues-lancéolées, à bord épineux-denté à forte épine noire terminale de 2 cm. Feuilles adultes pouvant atteindre 2 m de longueur
- Fleurs** : jaune-vert, en tube évasé, très nombreuses, dressées et regroupées au bout de rameaux horizontaux au sommet de la hampe florale, à étamines et style long et saillant. Espèce monocarpique (floraison unique puis mort après la maturation des fruits) : la floraison apparaît au bout de 10-20 ans et dure près d'un mois
- Fruits** : capsules de 4-5 cm (rarement développées)



© C. FAVIER VITTORI

Agave d'Amérique - *Agave americana* L., 1753

Milieux

- Côtes rocheuses et falaises
- Dunes côtières et plages de sable
- Milieux anthropiques

Reproduction


- Sexuée
 - Espèce monocarpique dont la floraison apparaît au bout de 10-20 ans
- Asexuée (végétative)
 - Drageons
 - Bulbilles présentes sur la tranche des feuilles



Données issues de la base de données SIMETHIS

Dernière observation en 2025

Carte : CBNC, 2026



Agave d'Amérique - *Agave americana* L., 1753

Méthodes d'éradication

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Petite population:

- Découpage des feuilles (scie, coupe-branche) afin de faciliter l'extraction et la manipulation (notamment pour les gros individus)
- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...)

Population importante:

- Arrachage mécanique (tractopelle/pelle mécanique)

→ Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : drageons, bulbilles...) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)



Gestion des déchets

-  Parties souterraines : exportation/incinération (pour éviter toute reprise)
-  Parties aériennes : incinération, compostage ou laisser sur place (si absence de fruits/graines)

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Ailante glanduleux, faux vernis du Japon - *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916

Description




J F M A M J J A S O N D

Règlementée en Europe depuis 2019
EVEE Majeure


- Arbre à feuillage caduc à tronc droit et écorce grise et lisse
- Taille** : 3 à 15 m
- Feuilles** : alternes, imparipennées composées de 6 à 12 paires de folioles lancéolées. Face supérieure vert foncé, face inférieure plus claire, pubescente et glanduleuse. Odeur désagréable
- Fleurs** : vertes/verdâtres de 5 à 6 mm en panicule
- Fruits** : samares ailées de 3 à 4 cm rougeâtres, contenant une graine




Ailante glanduleux, faux vernis du Japon - *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916



feuilles alternes




feuilles opposées



Feuille composée imparipennée


Feuille composée paripennée



Ailante glanduleux ou faux vernis du Japon - *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916

Milieux

- Berges et ripisylves
- Dunes côtières et plages de sable
- Forêts et maquis
- Milieux agricoles
- Milieux anthropiques (bords de routes, bords de voie ferrée...)
- Prairies, pelouses sèches et garrigues




Reproduction

Sexuée

- Pollinisation par le vent
- Dissémination des graines (jusqu'à 300 000 graines par arbre et par an) par le vent ou par l'eau
- Durée de vie des graines : en général 7 ans


Asexuée (végétative)


- Drageons + rejets de souche
- Extension des peuplements
- Accentuée si état de stress (lésion des racines, taille, coupe, incendie...)
- Fragment de racine : nouvel individu
- Tapis racinaire dense (dès 3 mois pour un jeune plant)
- Croissance rapide des rejets de souche : jusqu'à 3 cm par jour



Données issues de la base de données SIMETHIS







Ailante glanduleux ou faux vernis du Japon - *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916

Méthodes d'éradication

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Jeunes plans ou rejets (hauteur < 10 cm) :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) de l'intégralité de l'individu → Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : drageons, rejets de souche...) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Arbustes (Ø < 10 cm) :

- Abattage + dessouchage mécanique complet (avec extraction maximale du système racinaire accessible) afin de limiter les reprises végétatives à partir des fragments restants → suivi annuel sur 5 ans

Arbres (Ø > 10 cm) :

- Cerclage/annelage/écorçage : écorcer l'arbre jusqu'au xylème sur 40 cm de hauteur
→ Ecorçage + élimination des rejets/drageons/épaississements cicatrisés sur l'arbre 1 fois par an pendant 3 ans
→ Contrôle pendant 2 ans après les 3 années d'écorçage


A ne pas faire en cas de danger si chute de l'arbre



Gestion des déchets

- Parties souterraines : exportation/incinération (pour éviter toute reprise)
- Parties aériennes : incinération, broyage, compostage ou laisser sur place (si absence de fruits/graines)

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Mimosa d'hiver - *Acacia dealbata* Link, 1822

Mimosa argenté, Mimosa de Mearns, Acacia noir - *Acacia mearnsii* De Wild., 1925

Ailante glanduleux ou faux vernis du Japon - *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916



© K.BURON



© K.BURON

Cerclage d'*Acacia* sp.



@ Boyer M.

**Cerclage d'*Ailanthus altissima*
(Mill.) Swingle, 1916**



© Y.PETIT

**Cerclage de
Baccharis halimifolia L., 1753**

Aloé arborescente - *Aloe arborescens* Mill., 1768

Description



J F M A M J J A S O N D

EVEpotE Alerte

- Arbre à feuillage caduc à tronc droit et écorce grise et lisse
- Taille** : jusqu'à 2 m de hauteur
- Feuilles** : glaucescentes, courbées vers le bas, en rosettes denses à l'extrémité des tiges, atteignant 60 x 5 cm, longuement effilées et bordées de dents de 3 à 5 mm de longueur
- Flours** : rouge-orangé, tubuleuse d'environ 40 mm de long, regroupées en inflorescence en grappe de 15 à 30 cm
- Fruits** : capsule ovoïde-oblongue d'environ 18 mm de long, renfermant une dizaine de graines



© B. HUYNH-TAN


Aloé arborescente - *Aloe arborescens* Mill., 1768

Milieux

- Côtes rocheuses et falaises
- Milieux anthropiques

Reproduction

- Sexuée
 - Dissémination des graines par anémochorie (plus rare)
- Asexuée (végétative)
 - Bouturage




Données issues de la base de données SIMETHIS



© K. DIADEMA





Aloé arborescente - *Aloe arborescens* Mill., 1768

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi nécessaire pour éliminer les possibles rejets issus des fragments végétatifs oubliés, ainsi que les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)



Gestion des déchets

- 🍂 Stockage et séchage puis incinération



Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Griffe de sorcière - *Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br., 1926

Description



J F M A M J J A S O N D

EVEE Majeure

- Plante grasse vivace rampante
- Taille** : jusqu'à 55 cm de haut
- Feuilles** : charnues, à 3 angles, plus ou moins recourbées au sommet formant une griffe, la section transversale forme un triangle équilatéral. Couleur allant du vert au rouge en fonction des conditions climatiques
- Fleurs** : solitaires, fleurs blanc jaunâtre à sépales inégaux de 5 à 12 cm
- Fruits** : charnus en forme de figue, comestibles. Nombreuses graines de 1 mm de long (1000 à 1800 graines) engluées dans un mucilage très collant



Griffe de sorcière - *Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br., 1926

Milieux

- Côtes rocheuses et falaises
- Dunes côtières et plages de sable
- Milieux anthropiques

Reproduction

● Sexuée

- Dissémination des graines (jusqu'à 300 000 graines par arbre et par an) par les animaux (rats et lapins) et par les fourmis sur plus de 150 mètres
- Durée de vie de la banque de graines : minimum 5 ans


● Asexuée (végétative)

- Stolons qui peuvent grandir d'un mètre par an
- Extension des peuplements qui couvrent de grandes surfaces
- Bouture des tiges transportées par l'eau de mer ou par les oiseaux



Données issues de la base de données SIMETHIS





Griffe de sorcière - *Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br., 1926

Méthodes d'éradication

Surfaces planes

- Arrachage manuel → Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : tiges, stolons...) ainsi que les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Surfaces pentues

- Arrachage manuel + formation d'andains pour limiter l'érosion → Suivi nécessaire pour éliminer les fragments végétatifs oubliés (ex : tiges, stolons...) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans) + élimination des repousses sous les andains (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)


→ Zones en falaise : nécessité d'une entreprise spécialisée (cordistes) !

Gestion des déchets

- Andains : séchage sur place

- Laisser sur place sur une zone où la reprise de l'espèce n'est pas possible (rochers)

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Pin australien - *Casuarina cunninghamiana* Miq., 1848

Description



J F M A M J J A S O N D

EVEpotE Alerte

- Arbre à tronc droit et écorce brune fissurée et écailleuse
- Taille** : 12 à 35 cm
- Feuilles** : sous forme de petites dents verticillées par 7 – 10 portées sur des ramuscules verts de 10 à 20 cm de long
- Fleurs** : fleurs mâles brun-rougeâtre, allongées , de 2,5 cm de long au sommet des ramuscules. Fleurs femelles rouges, ovales, de 2-3 mm
- Fruits** : cônes ellipsoïdes ou subglobuleux, de 7 à 12 mm de diamètre, tronqués aux deux extrémités contenant des graines ailées



© Flora of Australia



© Floredesalpes



© Floredesalpes


Pin australien - *Casuarina cunninghamiana* Miq., 1848

Milieux

- Milieux anthropiques
- Bords de routes (Alignements d'arbres)
- Bords des cours d'eau


Reproduction

- Sexuée
 - Dissémination des graines par le vent ou l'eau
 - Durée de vie de la banque de graines : quelques jours à un an



Données issues de la base de données SIMETHIS

Carte : CBNC, 2026



Pin australien - *Casuarina cunninghamiana* Miq., 1848

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

Jeunes plans ou rejets :


- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus de des fragments végétatifs oubliés et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Arbustes ($\emptyset < 10$ cm) :

- Abattage + dessouchage mécanique complet (avec extraction maximale du système racinaire accessible) afin de limiter les reprises végétatives à partir des fragments restants → suivi annuel sur 5 ans
- Abattage + fauche des rejets au plus près du sol (5 à 6 fois par an) → suivi annuel sur 5 ans

Arbres ($\emptyset > 10$ cm) :

- Abattage + fauche des rejets au plus près du sol (5 à 6 fois par an) → suivi annuel sur 5 ans
 - Cerclage/annelage/écorçage : écorcer l'arbre jusqu'au xylème sur 40 cm de hauteur
→ Ecorçage + élimination des rejets/épaississements cicatrisés sur l'arbre 1 fois par an pendant 3 ans
→ Contrôle pendant 2 ans après les 3 années d'écorçage
- A ne pas faire en cas de danger si chute de l'arbre !



Gestion des déchets

- Parties souterraines : compostage car peu de risque de reprise
- Parties aériennes : compostage, broyage ou laisser sur place

Cotule Pied-de-Corbeau - *Cotula coronopifolia* L., 1753


Description



J F M A M J J A S O N D

EVEE Majeure

- Plante grasse vivace à annuelle succulente
- Taille** : 5 à 25 cm
- Feuilles** : charnues, glabres, de couleur vert tendre à foncé. Les feuilles embrassent la tige rougeâtre par une gaine, et prennent différentes formes : certaines sont linéaires, parfois dentées, d'autres lancéolées, ou encore découpées en lobes allongées
- Fleurs** : en boutons, d'un jaune vif de 8 à 10 mm de diamètre, dépourvus de ligules rayonnantes
- Fruits** : akènes comprimés, glabres ou finement glanduleuses, bruns



Cotule Pied-de-Corbeau - *Cotula coronopifolia* L., 1753

Milieux

- Berges de plans d'eau
- Zones ouvertes dans les marais ou prairies humides

Reproduction

- Sexuée
 - Dissémination des graines par les oiseaux ou l'eau
- Asexuée (végétative)
 - Marcottage et bouturage



© K. O'DEYE-GUIZIEN




Données issues de la base de données SIMETHIS



@G.PARADIS

Carte : CBNC, 2026



Cotule Pied-de-Corbeau – *Cotula coronopifolia* L., 1753

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

- Arrachage manuel → Suivi nécessaire pour éliminer les possibles rejets issus de fragments végétatifs oubliés (ex : tiges) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)
- Efficace sur les petites populations/populations éparses

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Gestion des déchets

- Conditionnement dans des sacs hermétiques
- Compostage des parties aériennes (si absence de fruits/graines + incinération des parties souterraines une fois sèches ou
- Séchage dans des sacs puis enfouissement



© L.SORBA



© L.SORBA

Souchet vigoureux - *Cyperus eragrostis* Lam., 1791


Description



J F M A M J J A S O N D

EVEE Majeure

- Plante herbacée vivace à souche rhizomateuse courte
- Taille** : 20 à 100 cm
- Tige** : dressée triangulaire, glabre, vert tendre.
- Feuilles** : alternes, linéaires, planes ou à section en forme de V, sans ligule à base engainante. Feuillage vert tendre à jaunâtres de 4 à 12 mm de large sur 25 à 50 cm de long
- Flours** : inflorescences en glomérules (boules sphériques) portées par des rayons (tiges) de taille variable allant de 1 à 10 cm, de couleur vert pâle devenant brun-roux à maturité
- Fruits** : akènes à trois angles



Souchet vigoureux - *Cyperus eragrostis* Lam., 1791

Milieux

- Berges et ripisylves
- Marais, tourbières, tufières
- Milieux anthropiques
- Prairies humides

Reproduction


- Sexuée
 - Dissémination des graines par l'eau ou par le vent
- Asexuée (végétative)
 - Rhizomes traçants
 - Bourgeons dans le collet



© F. LE DRIANT




© F. LE DRIANT



Données issues de la base de données SIMETHIS

Dernière observation
en 2025

Carte : CBNC, 2026



Souchet vigoureux – *Cyperus eragrostis* Lam., 1791

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus de des fragments végétatifs oubliés (ex : rhizomes) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)
- Efficace sur les petites populations/populations éparses

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Gestion des déchets

- Conditionnement dans des sacs hermétiques
- Compostage des parties aériennes (si absence de fruits/graines + incinération des parties souterraines une fois sèches ou
- Séchage dans des sacs puis enfouissement



Datura stramoine - *Datura stramonium* L., 1753

Description



J F M A M J J A S O N D




EVEE Modérée

- Plante annuelle très robuste, se ramifiant en parasol
- Taille** : jusqu'à 1 m de haut et un m de large (voire un peu plus)
- Tige** : tige robuste, creuse, glabre, verte à violacée, ramifiée de manière dichotomique. Racines peu profondes, très ramifiées. Parfois une racine pivot peut se développer
- Feuilles** : ovales, vert foncé, à odeur désagréable, et à dents inégales, les plus grandes généralement acuminées
- Fleurs** : blanches pur à mauves, tubulaires, 5-12 cm de long, solitaires, à l'aisselle des feuilles
- Fruits** : capsules ovoïdes, dressées, de 2-5 cm de diamètre, à épines denses ou rarement sans épines. Elles s'ouvrent en 4 segments et contiennent 600 à 700 graines brun foncé à noires de 3-4 mm de long



© C. FAVIER-VITTORI

types de formes de feuilles
mucroné apiculé acuminé



www.aquaportail.com

Datura stramoine - *Datura stramonium* L., 1753


Milieux

- Berges et ripisylves
- Milieux anthropiques
- Milieux agricoles

Reproduction

Sexuée

- Dissémination des graines par l'eau, les activités anthropiques ou par la plante elle-même (ouverture des capsules qui permet la dispersion des graines de 1 à 3 m)
- Un individu produit plus de 50 capsules et donc plus de 30 000 graines par an
- Graines viables pendant 40 ans dans le sol




Données issues de la base de données SIMETHIS



© Y.MORVANT



© Y.PETIT



Datura stramoine - *Datura stramonium* L., 1753

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi nécessaire pour enlever les repousses provenant de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Plante toxique



Pas d'incinération, car fumée hallucinogène et toxique



Gestion des déchets

- Laisser sur place ou regrouper dans un endroit inaccessible car toxique (si absence de fruits)



Eucalyptus - *Eucalyptus globulus* Labill., 1800

Description



J F M A M J J A S O N D

EVEE Modérée

- Arbre aux feuilles persistantes
- Taille** : jusqu'à 40 m
- Tronc** : écorce qui se détache en bandes irrégulières, lisse, gris-bleu
- Feuilles** : jeunes feuilles ovales, fines, subhorizontales et recouvertes d'une pruine cireuse bleu-gris, Feuilles adultes lancéolées, souvent en forme de faucilles et retombantes, de 10 à 30 cm, vert brillant
- Fleurs** : solitaires se formant à l'aisselle des feuilles, blanches
- Fruits** : capsule ligneuse avec 4 côtes principales





Eucalyptus – *Eucalyptus globulus* Labill., 1800

Milieux

- Milieux anthropiques


Reproduction

- Sexuée
 - Dissémination des graines par le vent après ouverture des capsules



Données issues de la base de données SIMETHIS





Eucalyptus – *Eucalyptus globulus* Labill., 1800

Méthodes d'éradication

Jeunes plans ou rejets :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) avec l'ensemble des racines → Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)


Arbustes ($\emptyset < 10$ cm) :

- Abattage + dessouchage mécanique complet (avec extraction maximale du système racinaire accessible) afin de limiter les reprises végétatives à partir des fragments restants → suivi annuel sur 5 ans
- Abattage + fauche des rejets au plus près du sol (5 à 6 fois par an) → suivi annuel sur 5 ans

Arbres ($\emptyset > 10$ cm) :

- Abattage + fauche des rejets au plus près du sol (5 à 6 fois par an) → suivi annuel sur 5 ans
 - Cerclage/annelage/écorçage : écorcer l'arbre jusqu'au xylème sur 40 cm de hauteur
→ Ecorçage + élimination des rejets/épaississements cicatrisés sur l'arbre 1 fois par an pendant 3 ans
→ Contrôle pendant 2 ans après les 3 années d'écorçage
- A ne pas faire en cas de danger si chute de l'arbre !

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Gestion des déchets

- Parties souterraines : compostage car peu de risque de reprise
- Parties aériennes : compostage, broyage ou laisser sur place

Gomphocarpe - *Gomphocarpus fruticosus* (L.) R.Br., 1809

Description



J F M A M J J A S O N D

EVEE Modérée

- Buisson vivace dressé
- **Taille** : 1 à 2 m
- **Tiges** : sous-ligneuses, dressées, très rameuses et très feuillées
- **Feuilles** : vertes, opposées, ou alternes sur les rameaux supérieures, linéaires-lancéolées, glabres
- **Fleurs** : inflorescences en cymes portant de nombreuses fleurs blanches
- **Fruits** : follicules renflés en vessie, ovales-acuminés, glabrescents, tout hérissés de longues soies vertes




Gomphocarpe - *Gomphocarpus fruticosus* (L.) R.Br., 1809

Milieux

- Milieux anthropiques
- Berges des cours d'eau
- Zones de pâturages
- Prairies

Reproduction

- Sexuée
 - Dissémination des graines par le vent, l'eau, les animaux ou les activités anthropiques
- Asexuée (végétative)
 - Drageons



Données issues de la base de données SIMETHIS




©L. NERY



©G. BLONDEAU

Dernière observation en 2025

Carte : CBNC, 2026



Gomphocarpe - *Gomphocarpus fruticosus* (L.) R.Br., 1809

Méthodes d'éradication

Jeunes individus :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...)

Individus matures :

- Arrachage manuel ou à l'aide d'un arrache arbuste



→ Efficace sur les petites populations/populations éparées

→ Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus de des fragments végétatifs oubliés (ex: drageons) et les repousses issues de la banque de graines

Gestion des déchets

- Parties souterraines : séchage dans des sacs puis compostage (pour éviter toute reprise)
- Parties aériennes : compostage ou laisser sur place (si absence de fruits/graines)

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Plante toxique, surtout le latex, les fruits et graines



Pas d'incinération, car fumée hallucinogène et toxique



Figuier de Barbarie - *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., 1768





EVEE Majeure

Description



J F M A M J J A S O N D

- Plante buissonnante vivace dressée
- Taille** : 1,5 à 3 m
- Tiges** : succulentes articulées, parfois sans épines, parfois possédant 1-2 (jusqu'à 6) aiguillons blancs par aréoles. Les articles sont aplatis en raquettes obovales épaisses, vert à vert glauque, de 20 à 60 cm de long sur 10 à 40 cm de large.
- Feuilles** : elles apparaissent sur les jeunes raquettes, elles sont réduites et éphémères
- Fleurs** : jaune franc de 6-7 cm de diamètre
- Fruits** : baies comestibles, de 7 à 9 cm de long, longtemps jaunâtre à rouge brique pâle, puis d'un rouge soutenu, couvertes de courtes épines. Les baies contiennent de 60 à 180 graines de 5 mm engluées dans un mucilage



Figuier de Barbarie - *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., 1768

Milieux

- Côtes rocheuses et falaises
- Milieux anthropiques


Reproduction

- Sexuée
 - Dissémination des graines par les animaux (endozoochorie)
- Asexuée (végétative)
 - Bouturage, à partir de raquettes tombées à terre. Une bouture est capable de produire des graines dès sa troisième année



Données issues de la base de données SIMETHIS





Figuier de Barbarie - *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., 1768

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

Petite population :

- Découpage afin de faciliter l'extraction et la manipulation (notamment pour les gros individus)
- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...)

Un fragment d'1 cm² suffit amplement pour reconstituer un individu viable (Gyrobroyage et broyage à proscrire !)



Population importante :

- Arrachage mécanique (tractopelle/pelle mécanique)

→ Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : rejets de souche...) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)



Gestion des déchets

- Enfouissement en profondeur (150 cm) ou
- Stockage et séchage puis incinération

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation




Figuier de Barbarie - *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., 1768



Oponce robuste - *Opuntia robusta* H.L.Wendl. ex Pfeiff., 1837

- Espèce exogène
- Non inscrite à ce jour sur les listes du Conservatoire Botanique National Corse
- À surveiller (potentiel invasif)
- Gestion similaire à celle d'*Opuntia ficus-indica*
- Différence avec les autres oponces : raquettes bien circulaires




Données issues de la base de données SIMETHIS



**Dernière observation
en 2025**

Carte : CBNC, 2026



Oxalis pied-de-chèvre - *Oxalis pes-caprae* L., 1753

EVEE Majeure

Description



J F M A M J J A S O N D

- Plante herbacée vivace pubescente, formant des colonies denses
- Taille** : 8 à 15 cm
- Tiges** : absence de tige
- Racines** : souches grêles, rampantes, munies de bulbilles isolés et sessiles, de la grosseur d'un pois. Produit annuellement une tige souterraine verticale
- Feuilles** : longuement pétiolées, trifoliées, en coeur. Limbe dépassant rarement 4 cm de diamètre, vert clair ou taché de brun
- Fleurs** : inflorescence en cymes de fausses ombelles jaunes de 3 à 20 fleurs, portées par un pédoncule charnu partant de la souche. fleurs jaunes, à 5 pétales libres, d'environ 2 cm, 4 fois plus longs que les sépales
- Fruits** : capsule cylindrique oblongue, pubescente, à poils appliqués. Fructification rare ou inexistante en France



© D.FELICIANO


Oxalis pied-de-chèvre – *Oxalis pes-caprae* L., 1753

Milieux

- Côtes rocheuses et falaises
- Forêts et maquis
- Milieux agricoles
- Milieux anthropiques


Reproduction

- Asexuée (végétative)
 - Production de bulbilles, le long de la tige souterraine, dispersées par le travail du sol, la pluie, les cours d'eau ou les sangliers



Données issues de la base de données SIMETHIS





Carte : CBNC, 2026

Oxalis pied-de-chèvre – *Oxalis pes-caprae* L., 1753

Méthodes d'éradication

Petite population :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) avec l'ensemble des bulbilles
- Suivi nécessaire pour éliminer les bulbilles oubliées (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Population importante : éradication manuelle difficile, coûteuse, efficacité faible à nulle

- Quantité importante de bulbilles dans le sol
 - Stimulation de la plante si gestion mal effectuée
 - Impact important sur le sol si décaissage
- Contrôle des populations existantes

Que faire ?

- Eviter les déplacements des terres contaminées
- Ne pas utiliser les terres contaminées dans des travaux de terrassements
- Préserver et/ou implanter un halo de végétation locale dense

Gestion des déchets

-  Enfouissement en profondeur (150 cm)
- ou
-  Stockage et séchage puis incinération



Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation



Oxalis articulé – *Oxalis articulata* Savigny, 1798

EVEpotE Alerte

Une localité mentionnée sur le site Natura 2000

Moins invasive que *Oxalis pes-caprae*

→ Reproduction différente absence de bulbes et de bulbilles, reproduction *via* des rhizomes

Différence avec *Oxalis pes-caprae* : fleurs roses

Gestion possible sur des petites populations


→ Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi annuel pendant 5 ans visant à éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex: rhizomes) et les repousses issues de la banque de graines



© F. LE DRIANT / FloreAlpes.com



Données issues de la base de données SIMETHIS



Paspale à deux épis- *Paspalum distichum* L., 1759

EVEE Majeure

Description



J F M A M J J A S O N D

- Plante herbacée vivace couchée, velue, stolonifère et rhizomateuse
- Taille** : 6 à 60 cm pouvant atteindre 1 m
- Feuilles** : feuilles longues, linéaires, larges de 3-7 cm, munies d'une ligule membraneuse courte et arrondie et d'une gaine fendue et cilié
- Flours** : inflorescence formée de 2 (rarement 3 ou 4) épis denses de 2 à 7 cm, vert pâle, disposés en V
- Fruits** : caryopses ayant une forte production de graines




Paspale à deux épis – *Paspalum distichum* L., 1759

Milieux

- Berges et ripisylves
- Marais, tourbières, tufières
- Milieux agricoles
- Milieux anthropiques
- Prairies humides

Reproduction


- Sexuée
 - Dissémination des graines par le vent, les mouvements d'eau, les animaux ou les activités anthropiques
- Asexuée (végétative)
 - Extension des stolons et fragmentation des rhizomes qui peuvent être transportés par l'eau



Données issues de la base de données SIMETHIS



Carte : CBNC, 2026



Paspale à deux épis- *Paspalum distichum* L., 1759

Méthodes d'éradication

Petite population :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi nécessaire pour éliminer les possibles rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : tiges, rhizomes et stolons), ainsi que les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

→ Efficace sur les petites populations/populations éparses



Gestion des déchets

Stockage et incinération

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Raisin d'Amérique- *Phytolacca americana* L., 1753

EVEE Majeure

Description



J F M A M J J A S O N D

- Plante herbacée vivace et robuste, à souche tubérisée
- Taille** : de 1 à 3 m
- Tige** : dressée, épaisse, striée, rougeâtre à ramifications dichotomiques
- Feuilles** : alternes à court pétiole. De forme ovales-lancéolées à extrémité aigüe, de 8 à 25 cm
- Fleurs** : en grappe de 10 cm, d'abord dressées puis pendante à maturité. La fleur est composée de 5 tépales blanches devenant rouges
- Fruits** : baies en grappes penchées, chacune de 1 cm de diamètre, d'abord vertes devenant pourpre-noir à maturité, contenant 10 graines



©J. MOLINA


Raisin d'Amérique- *Phytolacca americana* L., 1753

Milieux

- Berges et ripisylves
- Forêts et maquis
- Milieux agricoles
- Milieux anthropiques

Reproduction


- Sexuée
 - Grande quantité de graines produites : 1500 graines par individu
 - Graines viables pendant 40 ans dans le sol
 - Dissémination des graines par les animaux (endozoochorie)



Données issues de la base de données SIMETHIS



Carte : CBNC, 2026



Raisin d'Amérique- *Phytolacca americana* L., 1753

Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



Méthodes d'éradication

Petite population ou plants immatures et de petite taille :

- Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) avec extraction de l'appareil racinaire

Population importante :

- Fauche avant la floraison, puis deux à trois fois par an les années suivantes
- Coupe manuelle en dessous du collet : retirer la partie aérienne + creuser le sol pour dégager le collet + couper la racine sous le collet à au moins 5 cm sous la surface du sol (pioche, pic de cantonnier...)

Plante toxique



→ Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus du collet, les fragments végétatifs oubliés et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Gestion des déchets

Si incinération demander aux autorités compétentes l'autorisation


-  Parties souterraines : exportation/incinération (pour éviter toute reprise)
-  Parties aériennes : compostage ou laisser sur place (si absence de fruits/graines)



Séneçon du Cap - *Senecio inaequidens* DC., 1838

EVEpotE Alerte


- Une localité mentionnée sur le site Natura 2000 en 2000 (point approximatif)
- Se distingue des autres séneçons par son port en buisson et ses feuilles entières bordées de dents (ou rarement de petits lobes) très espacés
- Gestion possible sur des petites populations → Arrachage manuel (sécateur, serfouette, pioche, pelle, bêche...) → Suivi annuel pendant 5 ans visant à éliminer les rejets issus de des fragments végétatifs oubliés (ex: rhizomes) et les repousses issues de la banque de graines



Données issues de la base de données SIMETHIS

Non revu en 2025

Carte : CBNC, 2026



Flamboyant d'Hyères - *Sesbania punicea* (Cav.) Benth., 1859

EVEpotE Alerte

Description



J F M A M J J A S O N D

- Arbuste à feuilles caduques
- Taille** : jusqu'à 4m
- Feuilles** : paripennées, de 10 à 20 cm de long constituées de 10 à 40 folioles vert foncé
- Fleurs** : en grappes dressées, rouge vif, de 2 à 3 cm de long
- Fruits** : cosses oblongues de 6 à 8 cm de long et 1 cm de large, qui contiennent en moyenne 3 à 9 graines à 4 ailes marquées




Flamboyant d'Hyères - *Sesbania punicea* (Cav.) Benth., 1859

Milieux

- Berges des cours d'eau
- Milieux humides
- Milieux anthropiques

Reproduction

- Sexuée
- Grande quantité de graines produites : 100 à 300 cosses par individu
- Dissémination des graines par gravité, par les cours d'eau ou les activités anthropiques (terres transportées)



Données issues de la base de données SIMETHIS




©J. INNOCENZI



©N. SUBERBIELLE

Dernière observation en 2025

Carte : CBNC, 2026



Flamboyant d'Hyères - *Sesbania punicea* (Cav.) Benth., 1859


Méthodes d'éradication

Jeunes individus :

- Arrachage manuel (sécateurs, serfouette, pioche, pelle, bêches...)

Individus matures :

- Abattage du tronc + dessouchage (pour éviter les rejets de souche)



Important d'agir avant la fructification pour éviter la dissémination des graines lors de la gestion !



→ Suivi nécessaire pour éliminer les rejets issus des fragments végétatifs oubliés (ex : rejets de souche...) et les repousses issues de la banque de graines (au moins 1 fois par an pendant 5 ans)

Gestion des déchets

- Parties souterraines : séchage dans des sacs puis compostage (pour éviter toute reprise)
- Parties aériennes : compostage ou laisser sur place (si absence de fruits/graines)

Quelques espèces présentes uniquement sur la commune de Galeria

- ***Carpobrotus acinaciformis* (L.) L.Bolus, 1927** (EVEE Majeure)
- ***Oenothera biennis* L., 1753** (EVEpotE Alerte)
- ***Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng., 1826** (EVEpotE Alerte)
- ***Yucca gloriosa* L., 1753** (EVEpotE Alerte)



VI. Equipements de Protection Individuelle

Pourquoi se protéger ?

- Risques sanitaires ou de blessures
 - Eviter les blessures (*Opuntia* sp. *Agave americana*, etc.)
 - Eviter les réactions allergiques et irritations (*Gomphocarpus fruticosus*, *Phytolacca americana*, *Datura stramonium*, *Ailanthus altissima*)
- Travailler en sécurité sur le terrain



Quels équipements ?

- **Vêtements couvrants, Gants résistants et Masque Respiratoire (P3):** Protection contre les coupures et contre les contacts avec les plantes toxiques, allergènes, irritantes
- **Chaussures de sécurité :** Protection contre les chocs et amélioration de la stabilité en terrain accidenté
- **Lunettes de protection :** Protection des yeux contre les projections de terre, de poussières et de végétaux

VII. Comment agir à son niveau ?



Les bons gestes

- Respecter la réglementation (UE, FR...)(Site INV MED)



- S'informer sur les listes de plantes EVEC et EVECpotE en Corse (cbnc.oec.fr)
- Eviter de les planter (**principe de précaution**)
- Privilégier l'utilisation des espèces locales (CorsicaGrana)
- Ne pas jeter ses déchets verts dans la nature
- Prendre part au réseau de surveillance (Site INV MED ou cbnc@oec.fr)



Recommandations générales sur la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes


- 🍷 S'informer sur les modalités de gestion ([Site INV MED](#) ou cbnc@oec.fr)
- 🍷 Intervenir le plus tôt possible et dès l'installation des premiers individus : **coûts réduits + efficacité augmentée**
- 🍷 Ne pas disséminer toute ou une partie de plante
- 🍷 Eviter les déplacements et exportation des terres qui pourraient contenir des propagules ainsi que des graines d'EVEE pour éviter tout risque de contamination sur un autre site
- 🍷 Nettoyer complètement les machines utilisées pour la gestion des EVEE à l'aide d'un karcher
- 🍷 Eviter le gyrobroyage
- 🍷 Mettre en œuvre des moyens d'intervention adaptés à chaque espèce
- 🍷 Utiliser des équipements de protection individuelle



VIII. INV MED

- ✓ Plateforme INV MED
- 🍂 **Informations sur les espèces** (biologie, écologie, impacts, moyens de lutte...)
- 🍂 Ressources sur les différentes réglementations existantes
- 🍂 Actualités
- 🍂 Listes d'espèces
- 🍂 Guides bonnes pratiques
- 🍂 Actions réalisées et retours d'expériences

<https://invmed.fr/src/home/index.php>



Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Nom(s) vernaculaire(s)	Griffe de sorcière, Ficoïde doux, Figuier des Hottentots
Famille	Aizoaceae
Origine	Afrique
Date d'introduction	déb. XIXe



Régions administratives

PACA	Occitanie	Corse
Majeure	Majeure	Majeure

Zones biogéographiques continentales

Sud-Ouest	Pyrénées	Méd. Occ.	Méd. PACA	Massif Central	Alpine
Absente	Absente	Emergente	Emergente	Absente	Absente

- ✓ Plateforme INV MED
- Informations sur les espèces (biologie, écologie, impacts, moyens de lutte...)
- Ressources sur les différentes réglementations existantes
- Actualités
- Listes d'espèces**
- Guides bonnes pratiques
- Actions réalisées et retours d'expériences



LA PROBLÉMATIQUE ACTUS LISTE D'ESPÈCES STRATÉGIES ▾ AGIR ▾ RESSOURCES ▾

Listes d'espèces végétales exotiques envahissantes :
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse

Listes d'espèces végétales exotiques envahissantes :
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse

Listes méditerranéennes

Liste Provence-Alpes-Côte d'Azur

Liste Occitanie

Liste Corse

Listes méditerranéennes

Famille	Taxon reconnu	Nom(s) vernaculaire(s) INV MED	Liste PACA	Liste OCC.	Liste Corse	REG_UE
Pinaceae	Abies pinsapo Boiss., 1838	Sapin d'Espagne	✓		✓	
Malvaceae	Abutilon theophrasti Medik., 1787	Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste	✓	✓	✓	
Fabaceae	Acacia baileyana F.Muell., 1888	Mimosa de Bailey			✓	
Fabaceae	Acacia dealbata Link., 1822	Mimosa d'hiver, Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes	✓	✓	✓	
Fabaceae	Acacia longifolia (Andrews) Willd., 1806	Mimosa chenille, Acacia doré de Sydney, Mimosa à longues feuilles	✓		✓	
Fabaceae	Acacia mearnsii De Wild., 1925	Mimosa vert, Mimosa argenté			✓	✓
Fabaceae	Acacia melanoxylon R.Br., 1813	Acacia à bois dur, Acacia à bois noir	✓			
Fabaceae	Acacia paradoxa DC., 1813	Épine de kangourou	✓			
Fabaceae	Acacia pycnantha Benth., 1842	Mimosa doré, Acacia doré	✓			
Fabaceae	Acacia retinodes Schlttdl., 1847	Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons, Mimosa d'été	✓	✓	✓	
Fabaceae	Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820	Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre	✓	✓	✓	✓
Sapindaceae	Acer negundo L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable négondo	✓	✓	✓	

Listes méditerranéennes

Liste Provence-Alpes-Côte d'Azur

Liste Occitanie

Liste Corse



ALBIZIA LOPHANTHA, ACACIA DU CAP, ALBIZZIE À CRÊTES, ALBIZIA DE PLUMAS

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen, 1983

Famille : Fabaceae

Origine géographique : Océanie

Catégorie Corse : Alerte

Milieu(x) : Berges et ripisylves ; Côtes rocheuses et falaises ; Milieux anthropiques

[+ infos](#)



ARBRE À SOIE, ACACIA DE CONSTANTINOPLE, ALBIZIA

Albizia julibrissin Durazz., 1772

Famille : Fabaceae

Catégorie Corse : Alerte

[+ infos](#)

COMMENT SONT CONSTITUÉES
LES LISTES D'ESPÈCES ?

COMMENT GÉRER CES ESPÈCES ?

RÉGLEMENTATION

Filtres

Espèce
acacia

Famille


Catégorie Corse

Milieu

<https://invmed.fr/src/agir/actions.php?idma=51>

- ✓ Plateforme INV MED
- Informations sur les espèces (biologie, écologie, impacts, moyens de lutte...)
- Ressources sur les différentes réglementations existantes
- Actualités
- Listes d'espèces
- Guides bonnes pratiques
- Actions réalisées et retours d'expériences**

CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE DES ACTIONS



Filtrer les résultats

Nom de l'action

Type d'action

Nom du taxon

Années


Début

Fin

Rechercher

- ✓ Plateforme INV MED
- Informations sur les espèces (biologie, écologie, impacts, moyens de lutte...)
- Ressources sur les différentes réglementations existantes
- Actualités
- Listes d'espèces
- Guides bonnes pratiques
- Actions réalisées et retours d'expériences**

CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE DES ACTIONS



Filtrer les résultats

Nom de l'action

Type d'action

Nom du taxon

Années

Rechercher

- ✓ Plateforme INVMED
- Informations sur les espèces (biologie, écologie, impacts, moyens de lutte...)
- Ressources sur les différentes réglementations existantes
- Actualités
- Listes d'espèces
- Guides bonnes pratiques
- Actions réalisées et retours d'expériences**



Éradication d'une petite population de baccharis à feuille d'arroche (Tizzano, Corse-du-Sud)

Baccharis halimifolia L., 1753

Type d'action	Travaux (Éradication)
Durée	2015 - 2019
Nom du site	Marais de Tizzano (Tizzano, Corse-du-Sud)
Structure pilote	Conservatoire botanique national de Corse
Référent	PETIT Yohan
Financeur(s)	Conservatoire botanique national de Corse / Office de l'Environnement de la Corse
Partenaire(s)	Office de l'Environnement de la Corse



[Plus d'infos ...](#)



Description




La baie de Tizzano présente en son extrémité nord un marais du même nom. Ce marais est compris entre un cordon littoral étroit et de faible hauteur et des dépôts fluviaux amenés par des ruisseaux de longueur réduite. Le cordon littoral, présente la particularité d'être recouvert tout au long de l'année d'importantes couches de débris de posidonies apportés par la mer et particulièrement lors des tempêtes hivernales. Le marais de Tizzano et ses alentours, pourtant non classés en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), présentent un fort intérêt phytoécologique. De nombreuses espèces rares (R), très rares (RR) ou protégées (P) y sont recensées. Ce secteur comporte aussi une grande diversité de groupements de végétation parfois rares en Corse. Quelques individus de baccharis à feuille d'arroche, arbuste exotique envahissant réglementé, ont été observés pour la première fois en Corse courant septembre 2015 sur ce site. Une intervention rapide menée par le CBN de Corse a consisté à l'arrachage des jeunes individus et le cerclage des individus âgés. Cette population est supposée éradiquée depuis 2019.

IX. SORTIE TERRAIN

✓ 6 sites

- Pont des 5 arcades
- Plage à côté de la tour de Galeria
- Galeria
- Route qui mène dans la vallée du Fangu
- Pont du Vecchiu
- Piriù



✓ **Pont des 5 Arcades**

- Acacia dealbata,
- Eucalyptus globulus,
- Gomphocarpus fruticosus (si visible),
- Opuntia ficus-indica,
- Sesbania punicea



✓ **Plage à côté de la tour de Galeria**

- 🍂 *Carpobrotus* sp.,
- 🍂 *Cotula coronopifolia*,
- 🍂 *Cyperus eragrostis* (si visible),
- 🍂 *Gomphocarpus fruticosus* (si visible),
- 🍂 *Sesbania punicea*



✓ **Galeria**

- Acacia dealbata,
- Datura stramoine (si visible),
- Gomphocarpus fruticosus (si visible),
- Opuntia robusta,
- Sesbania punicea



✓ **Route qui mène dans la vallée du Fangu**

- Agave americana,
- Aloe arborescens,
- Carpobrotus sp.,
- Datura stramoine (si visible),
- Sesbania punicea



✓ **Ponte Vecchiu**

- Acacia dealbata,
- Datura stramoine (si visible),
- Gomphocarpus fruticosus (si visible),
- Sesbania punicea



✓ **Piriu**
✶ *Ailanthus altissima*





MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT

Conservatoire botanique national de Corse
Office de l'Environnement de la Corse
14 Avenue Jean Nicoli
20250 CORTI
cbnc@oec.fr

SUIVEZ-NOUS



POUR EN SAVOIR PLUS
www.cbnc.oec.fr